



⑮ **BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**  
**DE 100 08 089 A 1**

⑲ Aktenzeichen: 100 08 089.8  
⑳ Anmeldetag: 22. 2. 2000  
㉑ Offenlegungstag: 31. 10. 2001

㉒ Int. Cl.7:  
**C 07 K 5/078**  
C 07 D 277/56  
C 07 D 207/26  
C 07 D 207/38  
C 07 D 213/79  
C 07 C 271/22  
C 07 F 7/18  
// C07M 7:00

**DE 100 08 089 A 1**

⑦① Anmelder:  
Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH  
(GBF), 38124 Braunschweig, DE  
  
⑦② Vertreter:  
Patentanwälte Dr. Boeters, Bauer, Dr. Forstmeyer,  
81541 München

⑦③ Erfinder:  
Höfle, Gerhard, 38124 Braunschweig, DE; Leibold,  
Thomas, 38124 Braunschweig, DE; Steinmetz,  
Heinrich, 38124 Braunschweig, DE

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**


- ⑤④ Syntheseverfahren zur Herstellung von Tubulysinen  
⑤⑦ Erfindungsgemäß wird die absolute Konfiguration von  
Tubulysin, ein Verfahren zur Herstellung von Tubulysinen  
und die dabei eingesetzten Zwischenprodukte offenbart.

**DE 100 08 089 A 1**



# DE 100 08 089 A 1


Schema 2 Darstellung des Bausteins III (9)



Baustein IV: 4-Amino-5-phenyl-2-methyl-pentansäure (Tubuphenylalanin, Tup)

[0020] N-BOC-L-Phenylalanin 10 wurde durch Reduktion, Reoxidation mittels Swern-Oxidation und abschließende Wittig-Reaktion um eine  $\text{C}_2$ -Einheit verlängert. Es wurden zwei Produkte erhalten, bei denen es sich um das offenkettige E-Additionsprodukt 13 sowie das Lactam 12 handelte. Chromatographische Trennung und Hydrierung lieferte aus 13 ein 2:1 Isomerengemisch 15a/b, während aus 12 nur das BOC-geschützte Lactam 14 mit 2R/4R-Konfiguration entstand. Nach Ringöffnung und Veresterung mit Diazomethan wurde hieraus diastereomerenreines 15b erhalten (s. Schema 3).

Schema 3 Aufbau von Baustein IV ausgehend von Phenylalanin



Konfigurationsaufklärung durch GC-Vergleich an chiralen Phasen

Totalhydrolyse und Derivatisierung

[0021] Tubulysin wurde für 12 h mit 6 N Salzsäure, bzw. für die Bestimmung von Baustein IV mit Hydrazin-Hydrat bei 100°C abgebaut. Anschließend Veresterung mit methanolischer bzw. ethanolischer Salzsäure bei 100°C und Acylierung mit Trifluoressigsäureanhydrid lieferte die für die Messungen verwendeten Derivate. Die synthetisch aufgebauten Vergleichssubstanzen wurden unter identischen Bedingungen derivatisiert.


[0022] Da bei saurer Hydrolyse eine teilweise Epimerisierung an C-2 des Bausteins IV aufgetreten war, wurde für die Bestimmung der C-terminalen Aminosäure Hydrazin-Hydrat, ohne beobachtbare Epimerisierung, eingesetzt.

Konfigurationsaufklärung von Baustein III

[0023] Die Zuordnung der absoluten Konfiguration von Baustein III sollte zunächst wie bereits für die anderen Bausteine beschrieben erfolgen. Überraschenderweise wurde nach der Derivatisierung von reinem 9a eine starke Racemisierung des benzylicischen Zentrums festgestellt (20–40%). Dies war bei der Derivatisierung von Tubulysin ebenfalls zu beobachten (vollständige Racemisierung), weshalb eine direkte Zuordnung auf diesem Weg nicht möglich war.

[0024] Im Verlauf der Hydrolyse der beiden O-Acylgruppen konnten wir ein Tubulysin-Derivat 16 mit cyclischem N,O-Acetal isolieren, welches zweifelsfrei zumindest die relative Konfigurationszuordnung der beiden Zentren ermöglichte (s. Schema 4).


Schema 4 Synthese eines Tubulysin-Derivats mit cyclischem Acetal



[0025] Durch Vergleich der NMR-Daten von 16 mit Literaturwerten wurde für Baustein III eine relative trans-Konfiguration abgeleitet (s. Abb. 7).

[0026] Der Versuch, die noch fehlende absolute Konfiguration an C-3' durch Vergleich auf der Keto-Stufe 8 (s. Schema 5) durchzuführen, scheiterte, da auf verschiedenen chiralen GC- und HPLC-Säulen keine Trennung der Enantiomere erreicht werden konnte. Ein weiterer Abbau sollte nun durch Bayer-Villiger-Oxidation/-Hydrolyse und Vergleich der Produkte mit Valinol bzw. Homovalin erfolgen. Da die Reaktion selbst mit Pertrifluoressigsäure extrem langsam verlief (< 2% Umsatz in 7d), wurde ein ozonolytischer Abbau untersucht. Umsetzung von 8 mit Trimethylsilyltrifluormethansulfonat lieferte zunächst Silylenolether 17, der nach Ozonolyse und oxidativer Aufarbeitung sowie Veresterung zu N-Cbz-Valinethylester abgebaut wurde (s. Schema 5).

Schema 5 Abbauprobversuche ausgehend von Keton 8




[0027] Durch Anwendung dieser Abbau-Sequenz auf die aus Tubulysin hergestellte Aminosäure 19 konnte nun dem

# DE 100 08 089 A 1

letzten Stereozentrum die L-Konfiguration zugeordnet werden (s. Schema 6 und Abb. 8).


Schema 6 Abbau von Tubulyisin zu 20





[0028] Aus den Ergebnissen der GC-Untersuchungen ergibt sich für Tubulyisin folgende absolute Konfiguration (s. Abb. 9);

[0029] Zunächst sollte eine konvergente Totalsynthese von Tubulyisin D unter weitgehender Verwendung der bisher dargestellten Aminosäuren durchgeführt werden (s. Schema 9). N-Methylpipercolinsäure wurde in racemischer Form eingesetzt, eine Trennung erfolgte dann auf der Dipeptid-Stufe 27a/b. Baustein III wurde wie bereits beschrieben synthetisiert, der entscheidende Punkt ist hier der selektive Aufbau des Amidoacetals (s. Schema 7). Es ist vorgesehen, die 2'-Hydroxyfunktion im Baustein erst auf einer möglichst späten Stufe durch Reduktion des Ketons einzuführen.


Schema 7 Synthese von Baustein-II 22



[0030] Die Synthese von Baustein IV 25 wird durch Methylierung der Aminosäure in 2-Position unter Verwendung eines Evans-Auxiliars erreicht (s. Schema 8).



Schema 9 Kupplungsstrategie



[0031] Abschließende Reduktion und Acetylierung an C-1' von 'Tuv, Trennung der Diastereomeren und Abspaltung des TMSE-esters liefert 1.

Reagenzien auf S. 7

DECP/ $NEt_3$ : Phosphonsäurediethylester-cyanid/Triethylamin

PFPOH/DCC: Pentafluorphenol/Dicyclohexylcarbodiimid

PFPOtFA: Pentafluorphenol-Trifluoracetat

$Ac_2O$ : Essigsäureanhydrid

TBAF: Tetrabutylammoniumfluorid


[0032] Es ist uns gelungen, die absolute Konfiguration von Tubulysin durch Abbau und Vergleich mit Referenzsubstanzen aufzuklären. Die für die vier Aminosäure-Bausteine entwickelten Synthesen erlauben nun eine konvergente Totalsynthese der durch Isolierung nur in äußerst geringen Mengen zugänglichen natürlichen Tubulysine A-F. Darüber hinaus erlaubt es diese Strategie, durch Variation der vier Bausteine eine Bibliothek von stereoisomeren und strukturanalogen Tubulysinen herzustellen.

## Literatur

- 1) Sasse et al. (Poster) 10. Irseer Naturstofftage der Dechema e. V., Irsee, 1998.
- 2) a. G. R. Pellit et al., J. Nat. Prod. 1981, 44, 482-485; b. M. DeArruda et al., Cancer Res. 1995, 55, 3085-3092.
- 3) J. Lukas et al. Collect. Czech. Chem. Commun. 1957, 22, 286.
- 4) A. M. P. Koskinen et al. J. Org. Chem. 1998, 63, 92-98.
- [0033] In der Beschreibung und den Ansprüchen können R, R1 und R2 unabhängig voneinander ein H-Atom, eine Alkylgruppe, eine Arylgruppe oder eine Heteroarylgruppe darstellen.
- [0034] Vorzugsweise ist eine Alkylgruppe eine C1-6-Alkylgruppe, weist eine Arylgruppe bis zu vier gegebenenfalls annelierte Ringe auf und weist eine Heteroarylgruppe bis zu vier gegebenenfalls annelierte Ringe auf, wobei jeder Ring bis zu drei Heteroatome wie z. B. N, O oder S-Atome enthalten kann.

## Patentansprüche

## 1. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel



worin R<sup>1</sup> ein H-Atom, eine Alkylgruppe, eine Arylgruppe oder eine Heteroarylgruppe ist und R<sup>2</sup> ein H-Atom oder eine OH-Gruppe ist,

**dadurch gekennzeichnet,** daß


a) eine Verbindung der Formel 3\*



mit einer Verbindung der Formel 26




zu einer Verbindung der Formel 27b




umgesetzt wird;

b) eine Verbindung der Formel 22






in der  $R^1$  ein H-Atom, eine Alkylgruppe, eine Arylgruppe oder eine Heteroarylgruppe ist mit einer Verbindung der Formel 25




zu einer Verbindung der Formel 28



umgesetzt wird;

c) die Verbindung der Formel 27b mit der Verbindung der Formel 28 zu einer Verbindung der Formel 29




umgesetzt wird;

d) die Ketogruppe am 1'-C-Atom der Verbindung der Formel 29 in eine Acetylgruppe umgewandelt wird;


e) die Diastereomeren getrennt werden, und

f) der TMSE-Ester in eine COOH-Gruppe umgewandelt wird.


2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Schritt a) Phosphorsäurediethylester-cyanid/Triethylamin eingesetzt wird.
3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in Schritt b) Pentafluorphenol/Dicyclohexylcarbodiimid eingesetzt wird.
4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in Schritt c) zunächst Pentafluorphenol-Trifluoroacetat und dann Triethylamin/Pd/C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> eingesetzt wird.
5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in Schritt d) zunächst die Ketogruppe reduziert und dann das 1'-C-Atom acetyliert wird.
6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in Schritt f) tetrabutylammoniumfluorid eingesetzt wird.
7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß R eine C1-6-Alkylgruppe, eine Arylgruppe mit bis zu vier gegebenenfalls anellierten Ringen oder eine Heteroarylgruppe mit bis zu vier gegebenenfalls anellierten Ringen ist, wobei jeder Ring bis zu drei Heteroatome wie z. B. N, O oder S-Atome enthalten kann.
8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß R eine Ethyl-, Propyl-, i-Butyl-, sec-Butyl oder tert.-Butylgruppe ist.
9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung der Formel 3 als Racemat eingesetzt wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung der Formel 3 als L-Enantiomeres eingesetzt wird.
11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung der Formel 26 als Diastereomerenmischung eingesetzt wird.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung der Formel 26 in der allo-Form eingesetzt wird.
13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung der Formel 22 als Diastereomerenmischung eingesetzt wird.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung der Formel 22 diastereomerenrein eingesetzt wird.
15. Verbindung der Formel 9a/b



16. Verbindung nach Anspruch 16 mit einer R,R-, S,S-, R,S- oder S,R-Konfiguration.  
17. Verbindung der Formel 8




- dadurch gekennzeichnet, daß sie als L-Form oder als Racemat vorliegt.  
18. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel 8 – vorzugsweise mit Natriumborhydrid in einem Alkohol – reduziert wird.  
19. Verbindung der Formel 22



- worin R<sup>1</sup> ein H-Atom, eine Alkylgruppe, eine Arylgruppe oder eine Heteroarylgruppe ist.  
20. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel 8  
a) gegebenenfalls mit NaOH in H<sub>2</sub>O und  
b) gegebenenfalls mit TMSiOH und DCC versetzt wird und  
c) gegebenenfalls in Gegenwart von NaI mit einer Verbindung der Formel 21




- umgesetzt und dann  
d) gegebenenfalls mit Tetrafluorbutylammoniumfluorid versetzt wird.  
21. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel 8 dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel 7



- vorzugsweise in Gegenwart einer sauren Verbindung hydrolysiert wird.  
22. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel 7 dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel 5




- 5  
oxidiert und mit einer Verbindung der Formel 6



umgesetzt wird.

23. Verbindung der Formel 15b



24. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel 15b dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel 14



einer Ringöffnung unterworfen und das entstandene Produkt verestert wird.

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung 15b diastereomerenrein ist.

26. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel 14 dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel 12



hydriert wird.

27. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel 12 dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel 11




oxidiert und dann um eine C<sub>3</sub>-Einheit verlängert wurde.


28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Oxidation eine Swern-Oxidation ist.

29. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, daß die Verlängerung um eine C<sub>3</sub>-Einheit durch eine Wittigreaktion erfolgt.

30. Verbindung der Formel 25




31. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel 25, dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel 24



# DE 100 08 089 A 1

mit TNSBOH und DCC und dann mit  $\text{CF}_3\text{CO}_2\text{H}/\text{CH}_2\text{Cl}_2$  umgesetzt wird.

32. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel 24, dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel 23



10 in 2-Position methyliert wird, wobei ein Evans-Auxiliar eingesetzt werden kann, und die Esterfunktion dann hydrolysiert wird.

33. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel 23, dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel 11



20 zunächst einer Oxidation unterzogen wird und dann im Rahmen einer Wittig Reaktion umgesetzt wird.

34. Verfahren zur Herstellung von einer Verbindung der Formel 3



30 dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel 2



reduktiv aminiert wurde.

35. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungen der Formeln 2 und 3 in L-Form vorliegen.

Hierzu 10 Seite(n) Zeichnungen

Abb. 1









Abb. 2




Einbau von [ $^{13}\text{C}_2$ ]Acetat (  $\blackrightarrow$  ) und [ $^{13}\text{C}$ -Me]Methionin (  $\blacksquare$  ) In Tubulysin A



**Abb. 3a**  $^1\text{H}$ -NMR Spektrum von  
Tubulysin A (DMSO, 400 MHz)




# Abb. 3b $^{13}\text{C}$ -NMR Spektrum von Tubulysin A (DMSO, 400 MHz)







**Abb. 4** GC-Spektren von Baustein I  
(FS-Hydrodex  $\beta$ -3P, 25m, 120°C)




**Abb. 5** GC-Spektren von Baustein II  
(PermaBond L-Chirasil-Val, 25m, 80°C)



**Abb. 6** GC-Spektren von Baustein IV  
(FS-Hydrodex  $\beta$ -3P, 25m, 165°C)



**Abb. 7**



**Abb. 8** GC-Spektren von Baustein III  
(PermaBond L-Chirasil-Val, 25m, 80°C)




Abb. 9

